

INFORMACIÓN DEL CONSULTORIO

Fecha del procedimiento:

Horario de llegada:

Ubicación:

Preparación intestinal para colonoscopia con Moviprep

La colonoscopia es un procedimiento de rutina, indoloro y generalmente seguro, utilizado para examinar el colon. Usted, el paciente, debe seguir algunos pasos antes del procedimiento, a fin de garantizar el mayor nivel de seguridad y efectividad.

- 1 Pídale a una persona que lo lleve a su hogar después del procedimiento.
 - La colonoscopia requiere el uso de sedantes, y no se le permitirá retirarse del hospital si no está acompañado por otra persona.
- 2 Siga las instrucciones de su médico con respecto a los medicamentos que debe evitar y la dieta que debe seguir antes del procedimiento.
- 3 Termine todo el régimen de preparación intestinal como se describe en la página siguiente.



Moviprep está disponible en la mayoría de las farmacias minoristas. Si su farmacia no tiene Moviprep en inventario, se puede pedir y recibir en un plazo de 24 horas.

Información para su farmacéutico: NDC 65649-201-75

Moviprep
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

**Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.**


Instrucciones para el paciente

La caja de MoviPrep contiene 4 bolsas y un recipiente desechable para mezclar el producto. Debe completar toda la preparación para garantizar una limpieza más efectiva.

Inicio a las:

PASO 1


- Vacíe una bolsa A y una bolsa B en el recipiente desechable.
- Agregue agua potable tibia hasta la línea superior del recipiente. Mezcle hasta disolver.



Si lo prefiere, prepare la solución por anticipado y refrigérela antes de beber.
La solución reconstituida debe ser utilizada dentro de las 24 horas posteriores a la preparación.

PASO 2

- El recipiente de MoviPrep tiene 4 marcas divisorias. Cada 15 minutos, beba la solución hasta la marca siguiente (aproximadamente 8 oz), hasta completar todo el litro.
- Beba 16 oz del líquido claro de su preferencia.



Inicio a las:

- Repita los pasos 1 y 2.

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro consultorio al _____.

MoviPrep está indicado para la limpieza del colon, como preparación para la colonoscopia en adultos de 18 años o mayores. MoviPrep está contraindicado en pacientes que han presentado una reacción grave de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. MoviPrep deberá ser utilizado con precaución en pacientes a los que se administran medicamentos concomitantes que aumenten el riesgo de anomalías electrolíticas, en pacientes con hiponatremia conocida o presunta, colitis ulcerosa grave, íleo, obstrucción o perforación gastrointestinal, retención gástrica, colitis tóxica, megacolon tóxico o deficiencia de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. En ensayos clínicos, las reacciones adversas más frecuentes observadas con la administración de MoviPrep fueron distensión abdominal, molestia anal, sed, náuseas y dolor abdominal.

MoviPrep contiene un máximo de 2.33 mg de fenilalanina por tratamiento.

Lea todo el prospecto adjunto para MoviPrep.



Sitio web: www.salix.com 1700 Perimeter Park Drive, Morrisville, NC 27560 Tel. • 866.669.SLXP (7597)
©2007 Salix Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los EE. UU. MOV 06/04

MoviPrep[®]
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.